



自闭症的征兆

下面的征兆可能表示孩子发展异常，该马上地去科医生给孩子做自闭症的测试。

帮助家长检验孩子是否发展异常的
八大征兆

- 六个月大时，孩子还没有大笑，或做出其他很快乐的表情。
- 九个月大时，孩子还不能与他人分享声音，没有笑容，或其他表情。
- 十个月大时，孩子听到自己的名字还没有反应。
- 一岁大时，孩子还没有发出声音。
- 一岁大时，孩子还没有做出与外界交的手势，如指东西，给父母看东西，伸手拿东西，以及挥手等。
- 十六个月大时，孩子还没有语言。
- 两岁大时，在孩子的语言中，还没有出现由两个或两个以上单词组成的有意义的词组（不包括模仿）。
- 在任何时候，孩子的语言能力或社会互动能力出现退化现象。

当你发现你的孩子有上列异常征兆时，务必尽快带孩子去医院检查。



我们的使命

【世界自闭症意识日】 将帮助世人认识，自闭症是当前日趋严重的全球性健康危机。意识日的工作是为和强并发展，全世界人民对流行性自闭症的认识，同时把有关自闭症早期诊断和早期干预治疗的咨询传达给世人。此外，意识日还要赞誉一些自闭症患者的独特才干和技能，并且在**【世界自闭症意识日】**当天的全球性社区活动中，热情地欢饮和接纳自闭症患者。



© 二〇〇八年Autism Speaks。



World Autism Awareness Day
April 2, 2008

www.worldautismawarenessday.org

自闭症的事实

提高对自闭症的认识

- 研究提出，在目前世界一些地区，自闭症的患病率已经达到每一百五十人中就有一人，而且男童的患病率竟高达每九十四人中就有一人。
- 自闭症是当前世界上人数增长最快的一种病症。
- 根据今年的研究统计，儿童被诊断为自闭症的人数将超过被诊断为糖尿病，癌症以及艾滋病三类病童的总合。
- 男童患自闭症的机率是女童的四倍。
- 虽然目前医学还没有预防和根治自闭症的方法，但是早期诊断和早期干预治疗可以有效地改善自闭症患者的生活。

自闭症是什么？ 基本介绍

自闭症是一种复杂的神经生物性障碍疾病，是属于“自闭症症候群(ASD)”的一种。

根据最新调查发现，目前世界上有些地区，自闭症的患病机率高达每一百五十个儿童中就有一个是自闭症患者，其患病机率已经超过了儿童患糖尿病，癌症，以及艾滋病三者的总合。

虽然自闭症的患病率不受种族，阶级等因素影响，但是男童的患病率却高出女童的四倍。自闭症会影响患者的行为能力，其症状又因患者的轻、重程度而有所不同，然而其主要共同特点则包括社会交流障碍和刻板重复行为等。

过去，对自闭症的诊断，一般在儿童三岁之前就能诊断出来。根据过去的案例知道，往往是家长先发现自己孩子的行为异常或发展比较迟缓。有些家长描述说，早在孩子出生后，就发现孩子跟别的孩子不一样；也有些家长形容说，孩子出生时，发展正常，后来才慢慢退步。一般儿童科医生一开始可能不会特别重视这些问题，认为这些孩子可能只是发展稍微迟缓而已，很快就会赶上其他孩子了。他们可能会建议家长们说：“再等等看吧！”然而，最新研究证实了，儿童科医生在儿童六个月大时，就可能诊断出他们是否患有自闭症了。而且，家长怀疑自己孩子发展异常往往也是正确的。

一旦孩子被诊断出患有自闭症，该开始早期行为干预治疗。



虽然父母可能担心说孩子有自闭症，早期诊断让早期干涉更有效。到目前为止，医学还没有预防自闭症的办法，也没有完全有效治愈的方法。

有研究显示，为患有自闭症儿童提供学龄前两年的早期行为干预治疗，可以让他们的症状有很大的改善。譬如，让一个患有自闭症的儿童接受一周二十五个小时以上的强化行为训练，这个孩童的平均智商可能会提高二十八分！所以早期行为干预治疗可以为患有自闭症儿童的病情提供最大的帮助。因此，一旦孩子被诊断出患有自闭症，请尽快开始早期干预治疗。干预治疗为患者提供交流能力，社交能力，以及认知能力的学习。

觉悟和行动

目前，世界上仍有很多地区的政府和人民对自闭症认识不足，而造成做早期诊断的困难。因此，每个国家都必须提高人民对自闭症认识的水平，以便推展早期诊断。现在医学界已经研究出一套检查十八个月大儿童的方法。

当你带孩子去做例行健康检查时，就可以要求你的儿童科医生做这种检查。行文分析法(ABA)是一种有效的干预治疗方法。此外，也有很多自闭症儿童从语言治疗合作业治疗(OT)过程中受益。

